

Na čo sa opýtať vášho lekára

Ak máte príznaky stresovej inkontinencie, mali by ste kontaktovať svojho lekára, nakoľko je v súčasnosti dostupných viacero spôsobov liečby.

Svojho lekára sa opýtajte na možnosť liečby výplňou do mäkkých tkanív a na jej výhody, ako aj na iné možnosti liečby.



Speciality European Pharma Limited
14 Took's Court, London EC4A 1LB
Tel: +44 (0)20 7421 7400,
Fax: +44 (0)20 7421 7401
www.specialityeuropeanpharma.com



Contura International A/S
Sydmarken 23, DK-2860 Soeborg
Tel.: +45 81 100 900
Fax: +45 81 100 901
www.bulkamid.com

Distribútor pre Slovenskú republiku:



MEDITRADE spol. s r. o.
Levočská 1, 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 501 095 10
Fax: +421 2 556 489 25
obchod@meditrade.sk
www.meditrade.sk



IDEÁLNE RIEŠENIE STRESOVEJ INKONTINENCIE



Čo je stresová inkontinencia?

Stresová inkontinencia je veľmi bežný problém, ktorý postihuje milióny žien.

Stresová inkontinencia je zvyčajne dôsledkom oslabených alebo poškodených svalov, ktoré majú brániť úniku moču, ako sú svaly panvového dna a uretrálny zvierač. Ich oslabenie môže spôsobiť únik moču, keď je močový mechúr pod tlakom, napríklad pri smiechu alebo kašľaní.

Množstvo uniknutého moču je zvyčajne malé, avšak stresová inkontinencia môže zapríčiniť únik väčšieho množstva, obzvlášť, keď je močový mechúr príliš plný.

Pokojne sa smiať
Kýchnuť si bez následkov
Dvíhať
Behať
Kašľať
Skákať

Liečba

Stresová inkontinencia môže byť veľmi nepríjemný problém, avšak v súčasnej dobe je dostupných viacero foriem efektívnej liečby.


Liečba s Bulkamid® môže byť pre vás riešením. Bulkamid® je injekčná forma výplne do mäkkých tkanív. Ide o minimálne invazívnu procedúru s nízkou mierou komplikácií a krátkou dobou rekonvalescencie.

Zárok je vykonávaný pod lokálnou anestéziou.

Tri až štyri dávky hydrogél Bulkamid® sa injekčne aplikujú do steny močovej trubice, aby posilnili uzatvárací mechanizmus trubice.

Bulkamid® gél:

- Nie je absorbovateľný okolitým tkanivom
- Ostáva v mieste aplikácie
- Nespôsobuje alergické reakcie
- Nespôsobuje tvrdnutie tkaniva
- Zachováva elasticitu a štruktúru tkaniva
- Nezanecháva v tkanive žiadne mikročastice



Po liečbe

Po prvom bezproblémovom močení sa môžete vrátiť domov a pokračovať v každodenných aktivitách.

Možné vedľajšie účinky:

- Prechodná bolesť a krvácanie pri prvom močení.
- Zápal močového mechúra je zriedkavý, ale je ľahko liečiteľný antibiotikami.

IDEÁLNE RIEŠENIE STRESOVEJ INKONTINENCIE